

Я не жду чуда,
но хочу быть уверен,
что у нас есть план


ЦИРАМЗА®
(рамуцирумаб)



Стандарт 2-й линии терапии¹

ЦИРАМЗА® (рамуцирумаб)
+ паклитаксел

**ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА ИЛИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА ПОЗДНИХ СТАДИЙ
ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА ЦИРАМЗА® В КОМБИНАЦИИ С ПАКЛИТАКСЕЛОМ
СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМО УВЕЛИЧИВАЕТ ОБЩУЮ ВЫЖИВАЕМОСТЬ²**



ЧИСЛО ПАЦИЕНТОВ ПОД РИСКОМ

ЦИРАМЗА® 330 + паклитаксел	308	267	228	185	148	116	78	60	41	24	13	6	1	0
Плацебо 335 + паклитаксел	294	241	180	143	109	81	64	47	30	22	13	5	2	0

ОВ=общая выживаемость.

ОР 0,807 [95% ДИ: 0,678-0,962]
p=0,017

1. Бесова Н.С., Болотина Л.В., Гамаионов С.В. и соавт. Практические рекомендации по лекарственному лечению рака желудка. Злокачественные опухоли: Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2022 (том 12). 382–400 2. Wilke H, Muro K, Van Cutsem E, et al; for the RAINBOW Study Group. Ramucirumab plus paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (RAINBOW): a double-blind randomized phase 3 trial. Lancet Oncol. 2014; 15[11]:1224-1235

Только для специалистов здравоохранения

Чтобы ознакомиться с инструкцией по медицинскому применению препарата Цирамза отсканируйте QR код и перейдите по ссылке:



Данный материал разработан компанией Swixx. Компания Eli Lilly and Co. не несет никакой ответственности в отношении содержания и использования любых таких материалов
PM-RU-2023-11-5958, ноябрь 2023

Swixx BioPharma

ООО «Свикс Хэлскеа»
104065, Москва, Земляной вал, 9, info.russia@swixxbiopharma.com

Реклама