

Вектибикс


(панитумумаб)

СИЛА
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ
ТЕРАПИИ

МЕДИАНА ОБЩЕЙ
ВЫЖИВАЕМОСТИ
С ТЕРАПИЕЙ ПРЕПАРАТОМ
ВЕКТИБИКС

≥ 40


месяцев¹⁻⁵



1. Rivera F, et al. Final analysis of the randomised PEAK trial: overall survival and tumour responses during first-line treatment with mFOLFOX6 plus either panitumumab or bevacizumab in patients with metastatic colorectal carcinoma. *Int J Colorectal Dis* 2017. doi:10.1007/s00384-017-2800-1.
2. Peeters M et al. Impact of POBt-Progression Anti-Vascular Endothelial Growth Factor-Containing Therapy on Survival in Patients with Metastatic Colorectal Cancer: Data from the Prime Study. *Markers in Cancer - A joint meeting by ASCO, EORTC and NCI; Brussels, Belgium; 7-9 November 2013.* POBter MC13-0024.
3. Peeters M et al. Resection Rates and Survival in Patients with Wild-Type KRAS/NRAS Metastatic Colorectal Cancer and Liver Metastases: Data from the Prime Study. *Markers in Cancer - A joint meeting by ASCO, EORTC and NCI; Brussels, Belgium; 7-9 November 2013.* POBter MC13-0022.
4. Boeckx N, et al. Primary tumor sidedness has an impact on prognOBis and treatment outcome in metastatic colorectal cancer: results from two randomized first-line panitumumab studies. *Ann Oncol*. 2017. doi: 10.1093/annonc/mdx119.
5. Carrato A. et al. First-line panitumumab plus FOLFIRI or FOLFIRI in colorectal cancer with multiple or unresectable liver metastases: A randomised, phase II trial (PLANET-TTD). *Eur J Cancer*. 2017;81:191-202.

PEAK: FOLFOX6 + панитумумаб vs FOLFOX6 + бевацизумаб в 1-й линии терапии мКРР у нерезектабельных пациентов. Эксплоративный групповой анализ*¹.

ВЕКТИБИКС ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАННИЙ, ГЛУБОКИЙ И ДЛИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ ОПУХОЛИ



- Ранний, глубокий и стойкий ответ опухоли может обеспечить уменьшение ее симптоматики²
- Строгая корреляция между частотой ответа и частотой резекций у пациентов с изолированными метастазами в печени^{3,4}

*В данный эксплоративный ретроспективный субпопуляционный анализ включались пациенты, принимавшие участие в исследовании PEAK, которые страдали мКРР, с экспрессированным RAS дикого типа, с наличием одного опухолевого очага, поддававшегося измерению в одном размере 20 мм. Опухолевая масса определялась как сумма размеров всех целевых очагов. Один пациент, получавший комбинацию бевацизумаб + FOLFOX (n = 82), был исключен из анализа, поскольку сумма наибольших размеров целевых очагов у него была потеряна/неизвестна.

1. Rivera F. et al. Final analysis of the randomised peak trial. // Int. J. Colorectal Dis. – 2017. – doi:10.1007/s00384-017-2800-1;

2. Rivera F. et al. Presented at the Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco, CA, USA; January 15–17, 2015. – Abstract 660;

3. Folprecht G. et al. Neoadjuvant treatment of unresectable colorectal liver metastases: correlation between tumour response and resection rates. // Ann. Oncol. – 2005. – V. 16. – P. 1311–1319;

4. Jones R.P. et al. Defined criteria for resectability improves rates of secondary resection after systemic therapy for liver limited meta static colorectal cancer. European Journal of Cancer 50. – 2014. – P. 1590–1601.

Имеются противопоказания и побочное действие. Перед назначением лекарственного препарата необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. РУ ЛСР-007740/09

RU-VBX-1020-00037